



Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver

## Cosa succede se mi taglio o cado mentre assumo un farmaco anticoagulante?



warfarin



### Che cos'è un farmaco anticoagulante?

- I farmaci **anticoagulanti** sono usati per aiutare a **ridurre la probabilità di formazione di coaguli** o fermare l'ingrandimento di coaguli esistenti all'interno della tua circolazione sanguigna. I farmaci anticoagulanti orali possono avere diversi nomi come:
  - ★ Warfarin (Coumandin®)
  - ★ Rivaroxaban (Xarelto®)
  - ★ Apixaban (Eliquis®)
  - ★ Dabigatran (Pradaxa®)
  - ★ Edoxaban (Lixiana®)
- Altri farmaci anticoagulanti ad iniezione sono l'eparina:
  - ★ Enoxaparin (Lovenox®)
  - ★ Tinzaparin (Innohep®)
  - ★ Dalteparin (Fragmin®)

## Cosa devo fare se cado e ho preso il farmaco?

Se stai sanguinando, applica pressione sul taglio. Utilizza una garza oppure un fazzoletto se non hai altro a portata di mano:

- Ci possono volere fino a circa venti (20) minuti prima che si fermi l'emorragia
- Se l'emorragia prosegue dopo i 20 minuti, continua ad applicare pressione e vai al più vicino Pronto Soccorso
- **Se il taglio è grande e continua a sanguinare, applica pressione e chiama immediatamente il 118!**
- Quando vai in ospedale, **comunica subito all'infermiere e al medico che assumi una terapia anticoagulante!**

## Quando devo chiamare il mio Medico Curante?

- Ho sbattuto la testa anche senza sanguinamento
- Mi sento diverso dal solito ma non so perché
- Ho un dolore mai avuto prima
- Ho diversi lividi anche di grandi dimensioni

## Quando devo andare in Pronto Soccorso?

- Ho forte dolore alla schiena che prosegue nelle ore
- Ho spossatezza, giramenti di testa e respiro male
- Mi fa male il torace
- Ho un forte mal di testa (sembra quasi un'emicrania)
- Ho dolore all'addome